



تمزق المرفق (لدى الطفل)

إذا كشفت الفحوصات بأن لدى طفلك تمزق بالمرفق .

فهي حالة شائعة بين الرضع والاطفال الصغار تحدث لهم عندما يتم سحب او رفع الطفل من معصمه (رسغ يده) وبذلك تصبح العظمتين بوضع غير طبيعي . فإذا تأكدت من إصابة طفلك بتمزق بالمرفق فان معالجة هذا الامر سيكون بإعادة رص هذه العظام من خلال عملية بسيطة وهي لا تستلزم مخدر (بنج) او اشعة اكس للتثبيت . وقد يعاني طفلك من انزعاج بسيط اثناء حدوث هذه العملية،ولكن اذا سارت الامور على نحو صحيح فسوف يتمكن من تحريك ذراعه خلال دقائق .

يجب ان تلتزم بـ :

* إعطاء طفلك دواء الكالبول او الايبروفين ليساعده في تهدئة وتسكين الالم .

يجب ان تمتنع عن :

* سحب ذراع طفلك كما في الالعاب عندما تقوم بمرجحته او ان تشد ذراعه بقوة .

ارجو ان تتذكر ما يلي :

قد يحصل تمزق المرفق في اي وقت وفي كلتا الذراعين حتى بلوغ طفلك سن السابعة او الثامنة من العمر، حيث سيكتمل نمو المرفق ويتوقف تحركه من حلقة الليفية في هذا العمر ، ولهذا كن حذراً عند الإمساك بذراع طفلك.